

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/buxatrap-pulapka-feromon-zestaw-wabiacy-cme-bukszpanowa-p-3953.html>



BUXATRAP pułapka + feromon - ZESTAW wabiący ĆMĘ BUKSZPANOWĄ

Cena	120,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	KOPPERT

Opis produktu

BUXATRAP + feromon (zestaw) wabiący Ćmę Bukszpanową

Pierwszym krokiem w walce z ćmą bukszpanową jest wczesne wykrywanie szkodnika. W tym celu najlepiej użyć pułapki Buxatrap z kapsułkami feromonowymi Pherodis, dedykowanymi do wabienia samców danego gatunku

Buxatrap to profesjonalna pułapka feromonowa przeznaczona do stosowania w połączeniu z odpowiednią dla gatunku kapsułką feromonową Pherodis do zwalczania ćmy bukszpanowej (*Cydalima perspectalis*). Wysoka skuteczność wyłapywania jest zapewniona, dzięki umieszczeniu w pułapce dwóch koszyczków na feromony. W szybkim czasie można odłowić dużą ilość szkodników.

- Pułapka Buxatrap wraz z feromonami to produkt mający na celu kontrolę biologiczną ćmy bukszpanowej
- Pułapka jest bardzo prosta w użyciu posiada dwa koszyczki w których umieszczamy kapsułki z feromonem
- W konkursie Nowości Ogrodniczych 2021 organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych "Pielęgnacja i ochrona roślin" - I miejsce i złoty medal zdobył BUXATRAP z kapsułkami feromonowymi

EFEKT jednego dnia pracy BUXATRAP-u z feromonem wabiącym ćmę bukszpanową



Do czego używamy pułapki Buxatrap ?

Jest to doskonała i zarazem prosta w użyciu pułapka w połączeniu z odpowiednim feromonem do kontrolowania występowania ćmy bukszpanowej (*Cydalima perspectalis*).

Pułapka ma bardzo dużą skuteczność, ponieważ substancja wabiąca samce ćmy jest dedykowana dla tego konkretnego gatunku co jest ogromną zaletą. Z doświadczeń wynika, że ma ona dłuższy czas działania niż inne feromony dostępne na rynku. Wyłapywanie dorosłych samców uniemożliwia im kontakt z samicami a tym samym rozpoczęcia całego procesu składania jaj.

Co zawiera ten zestaw ?

Zestaw ten zawiera 1szt pułapki Buxatrap z wieszakiem oraz 2 kapsułki z feromonem, które wystarczą na jednorazowe załadowanie pułapki.

Kiedy używać pułapki Buxatrap?

Używamy do kontroli występowania i wyłapywania ćmy bukszpanowej (*Cydalima perspectalis*).

Ćma bukszpanowa atakuje zarówno bukszpan zwyczajny (*Buxus sempervirens*), jak i gatunki *Buxus microphylla*, *Buxus sinica* i *Buxus colchica*. Ćma może wyrządzać ogromne szkody w szkółkach, parkach i ogrodach. Zaatakowane drzewa są dodatkowo narażone na atak grzyba *Cylindrocladium buxicola*.

Na jakiej zasadzie działa Buxatrap?

Buxatrap to pułapka feromonowa używana w połączeniu z dozownikami feromonów Pherodis. Dozownik feromonów uwalnia odpowiedni dla gatunku feromon płciowy, który wabi dorosłe samce ćmy bukszpanowej do pułapki. Motyle zachęczone substancją wabiącą wchodzą do pułapki, z której nie mogą się wydostać.

Kiedy i jak stosować Buxatrap ?

Pułapki należy stosować od maja/czerwca do końca listopada, czyli w okresie aktywności ciem.

- W przypadku wyższych bukszpanów (> 1,5 m) pułapkę należy zawiesić na wysokości wzroku.
- W przypadku niższych bukszpanów (< 1,5 m) pułapkę należy zawiesić na wieszaku.

- Wymieniać kapsułki z feromonami co osiem tygodni.

Buxatrap to pułapka feromonowa używana w połączeniu z dozownikami feromonów Pherodis. Dozownik feromonów uwalnia odpowiedni dla gatunku feromon płciowy, który wabi dorosłe samce ćmy bukszpanowej do pułapki.

Dozowanie

Dozowanie

Poniższe informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny. Zalecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb wymagają szczegółowych informacji na temat czynników lokalnych, takich jak rodzaj upraw, warunki klimatyczne i natężenie inwazji szkodników. Informacje o właściwych metodach należy uzyskać od specjalisty firmy Koppert lub oficjalnego dystrybutora produktów Koppert.

Buxatrap	dozowanie	odstęp (dni)	częstotliwość	uwagi
Prewencyjne	Jedna pułapka na 180 m ²	Stosować od maja/czerwca do końca listopada, czyli w okresie aktywności ciem	Wymieniać feromon Pherodis co osiem tygodni	Zawiesić pułapkę na wysokości 1,5 m (patrz opis stosowania)
Interwencyjne	Jedna pułapka na 30 m ²	Stosować od maja/czerwca do końca listopada, czyli w okresie aktywności	Wymieniać feromon Pherodis co osiem tygodni	Zawiesić pułapkę na wysokości 1,5 m (patrz opis stosowania)

		ciem		
--	--	------	--	--

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)