

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/dobroczynek-gruszowy-500-opasek-p-783.html>



DOBROCZYNEK GRUSZOWY OPASKI FILCOWE 500 sztuk (dostawa marzec 2024r)

Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	DG-500
Producent	KOPPERT
Zasady zakupu / Terminy dostaw	przed zakupem przeczytaj
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

PRZEDSPRZEDAŻ

- ✓ Dokładne zasady zakupu na karcie tego produktu w zakładce "Zasady zakupu dobroczyńka gruszowego"
- ✓ Uwaga przedsprzedaż: Złóż i opłać swoje zamówienie - dostawa marzec 2024r

DOBROCZYNEK GRUSZOWY OPASKI FILCOWE 500 sztuk

Dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri) - drapieżny roztocz.

Zastosowanie:

Do zwalczania różnych gatunków przędziorków i szpicieli w sadach.
Uwaga! dobroczynek gruszowy nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach.

Opakowanie zbiorcze:

filcowe opaski, 10 x 50 szt. (500 opasek)

Zawartość:

zimujące samice.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładkach "Informacje producenta", "wpływ pestycydów na dobroczyńka" na karcie produktu
Artykuł : [Przędziorki szkodliwość i zwalczanie metoda biologiczną czytaj](#)

Produkt prezentowany w programie "Maja w ogrodzie"

["Swojski ogródek w ruchliwej Warszawie \(odc. 422\)" zobacz film kliknij](#)
["Ogród na tarasie \(odc. 474\)" minuta 9:10 zobacz film kliknij](#)

Odpowiednie pakowanie i wysyłka gwarancją jakości

Nowe opakowania ekologiczne utrzymujące temperaturę w większości zastąpiły pojemniki izolacyjne. Bardziej prośrodowiskowe rozwiązanie, które sprostało naszym wysokim wymaganiom ekologicznym. Od teraz opaski wysyłane są w kartonach z wkładką wypełnioną celulozą, która nadaje się do recyklingu. Wkładka ta zapewnia izolację termiczną, która

zabezpiecza zawartość przesyłki z dobroczyńnikiem przed temperaturą otoczenia oraz minimalizuje uszkodzenia mechaniczne pojawiające się podczas transportu. Tak wysyłane opaski przewożone mogą być w bezpieczny sposób nawet do 48 godzin.

Koppert

DYSTRYBUTOR



Informacje producenta

Koppert

DYSTRYBUTOR

Typhlodromus pyri - Dobroczynek gruszowy

Dobroczynek gruszowy to drapieżny roztocz zasiedlający różne rośliny. Żywi

się szkodliwymi przedziorkami, roztoczami i szpecielami, jednak nigdy nie powoduje szkód na roślinach. Niektóre populacje tego roztocza są odporne na pestycydy i odgrywają ważną rolę w programach integrowanej ochrony przed szkodnikami upraw sadowniczych w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii.

Dobroczynek gruszowy występuje naturalnie również w Polsce. Zapłodnione samice zimują w szczelinach kory na krzewach i drzewach. Wiosną stopniowo stają się aktywne, przechodzą ze schronisk zimowych do korony drzewa, żywią się roślinożernymi roztoczami i mnożą. Każda samica zjada średnio ok. 8 dorosłych przedziorków dziennie, czyli 550 przedziorków przez całe swoje życie. Ponadto drapieżniki te mogą żywić się pyłkiem lub grzybami i to pozwala im przetrwać na roślinach nawet wtedy, gdy nie ma tam szkodników. Jesienią samice zaprzestają składania jaj i przechodzą z liści na korę poszukując schronienia. Samce giną.

Jak wprowadzić dobroczyńka gruszowego do uprawy?

Samice zimujące *Typhlodromus pyri* (południowo morawski szczep "Mikulov") są ukryte w filcowych paskach. Należy je ściśle przywiązać do pni lub gałęzi drzew owocowych lub winorośli, aby umożliwić roztoczom przejście z pasków na rośliny. Każdy pasek zawiera co najmniej 15-20 drapieżników. Im więcej drapieżników zostanie uwolnionych z paska tym lepiej. Jako minimum, zaleca się zawieszenie jednego paska na każdej, co trzeciej winorośli lub na co drugim drzewie owocowym. Najlepszy termin na wprowadzenie dobroczyńka to bardzo wczesna wiosna. Po tym jak intordukujemy drapieżniki do sadu można stosować tylko pestycydy, które są oznaczone dla nich, jako nieszkodliwe lub umiarkowanie szkodliwe.

Drapieżnik jest zdolny do kontrolowania populacji przedziorków i szpecieli w komercyjnych sadach i winnicach, jednak zajmuje to trochę czasu. W zależności od liczby uwolnionych drapieżników dobre wyniki kontroli osiągnąć się w czasie 2 lub 3 sezonu wegetacyjnego po ich uwolnieniu. Populacja musi się namnożyć. Im więcej drapieżników jest wprowadzonych do sadu, tym wcześniejszej i skuteczniejszej ochrony można się spodziewać.

Dawkowanie:

Jabłonie

1500-3000 paski na hektar, w zależności od wieku i wielkości drzew

- W młodych lub intensywnych sadach: 1-2 paski na co drugie małe drzewo
- W starszych sadach z większymi drzewami: 2-3 paski na drzewo

Winnice

Minimalnie 1 pasek na każdą co 3-cią winorośl w winnicy. Szybkie i dobre wyniki biologicznej ochrony uzyskuje się zazwyczaj po zastosowaniu 1 paska na każdą winorośl.

Ważne informacje:

- Zamocuj opaski za pomocą zszywek lub sznurka do pni, gałęzek drzew lub krzewów tak aby ściśle do nich przylegały.
- Po dostawie w przeciągu 24h umieścić opaski na roślinach lub przechowywać w ciemności i niskiej temperaturze około -5°C do + 5°C przez maksymalnie 7 dni
- Nie wyjmować opasek z kartonu transportowego , który należy postawić w chłodnym miejscu (na balkonie, w nieogrzewanym garażu itp) w ciemności
- Uwaga aby słońce nie ogrzewało pojemnika. Przy temperaturze 10°C i pod wpływem światła samice zaczynają wychodzić z opasek do opakowania, a chcemy aby wyszły na drzewa lub krzewy, gdzie założą populację drapieżnika.
- Nie należy opóźniać terminu zastosowania produktu. Nie czekamy na nadejście wiosny !!!

Zasady zakupu dobroczynka gruszonego

ZAMÓWIENIE DOBROCZYNIKA GRUSZOWEGO / TERMINY DOSTAWY

✓ Jak i kiedy zamówić dobroczynka gruszonego?

Zamówienia na dobroczynka gruszonego przyjmowane są przez producenta do końca roku 2023 roku (czasami producent przedłuża ten termin). Zamawiając produkt w tym terminie mają Państwo gwarancję otrzymania produktu luty/marzec 2024 roku. Dokładny termin ogłasza producent.

Zamówienia złożone po tym terminie będą mogły być realizowane z puli rezerwowej, jeżeli taka będzie dostępna (tu decyduje kolejność zgłoszeń) dotychczas taka pula była bardzo ograniczona. Dlatego nie zwlekaj z zamówieniem.

Dokonując zakupu dobroczynka gruszonego nie należy dodawać do koszyka

innych produktów gdyż blokada uniemożliwi dokonanie zakupu

✓Dostawa dobroczynka gruszowego:

luty / marzec 2024 roku dokładne terminy podjemy jak tylko zostaną ogłoszone przez producenta (luty/marzec). Dostawa jednorazowa do wszystkich Klientów.

✓Koszt dostawy dobroczynka gruszowego

Koszt dostawy 33zł

Wpływ pestycydów



Selektywność środków owadobójczych i fungicydów w stosunku do dobroczyńka gruszcowca

	Nazwa preparatu (substancja aktywna)	Działanie na <i>Typhlodromus pyri</i>
insektycydy i akaricydy	Apollo Plus 500 SC (chlofentezyna)	S
	Actara 25 WG (tiametoksam)	S
	Carpovirusine SC (Virus Granulozy)	S
	Coragen 200 S.C. (chlorantraniliprol)	S
	Dimilin 25 WP (diflubenzuron)	S
	DiPel WG (Bacillus thuringiensis s. kurstaki)	S
	Ekodan-CP VP (kodieban)	S
	Madex SC (Baculovirus)	S
	Nissorun 10 WP (heksythiazoks)	S
	Mospilan 20 SP (acetamipryd)	S
	Steward 30 WG (indoksakarb)	S
	Catane 800 EC (olej parafinowy)	S/C
	Envidor 240 SC (spirodiklofen)	S/C (1x / sezon)
	Movento 100SC (spiroetramat)	S/C
	Pirimor 500 WG / gro Pyrimicarb (pirimikarb)	S/C
	Promanal 60 EC (olej parafinowy)	S/C
	Runner 240 SC (metoksifenazyd)	S/C
	Terol 770 EC (olej parafinowy)	S/C
	Zoom 110 SC (etoksazol)	S/C
	Decis 2.5 EC (deltametryna)	N
	Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna)	N
	Ortus 05 SC (fenpiroksymat)	C/N
	Reldan 225 EC (chlorpiryfos metylowy)	N
	Sanmite 20 WP (pyridaben)	N
	Sherpa 100 EC (cypermetryna)	N
fungicydy	Allette 80 WG (fosetyl glinowy)	S
	Bumper 250 EC (propikonazol)	S
	Chorus 50 WG (cyprodynil anielinoprymidynowy)	S
	Discus 500 WG (krezoksym metylowy)	S
	Flint Plus 64 WG (kaptan, trifloksystrobina)	S
	Kaptan zaw. 50 WP (kaptan)	S
	Mythos 300 S.C. (pirymetanił)	S
	Polyram 70 WG (metiram)	S
	Rovral Aqua Flo 50 S.C. (iprodion)	S
	Score 250 EC (difenokonazol)	S
	Sylit 65 WP (dodyna)	S
	Teldor 500 S.C. (fenheksamid)	S
	Tercel 16 WG (ditianon, piraklostrobina)	S
	Zato 50 WG (trifloksystrobina)	S
	Antracol 70 WG (propineb ditiokarbaminianowy)	S/C
	Champion, Miedzan (wodorotlenek Cu, tlenochlorek Cu)	S/C
	Dithane Neo Tec 75 WG (mankozeb)	S/C (1x / sezon)
	Funguran-OH 50 WP (wodorotlenek Cu)	S/C
	Horizon 250 EW (tebukonazol)	S/C
	Thiram Granfio 80 WG (tiuram)	S/C
	Sadoplun 75 WP (tiuram)	S/C
	Siarkol Extra 80 WP (siarka)	C (1x / sezon)

S - selektywny C - częściowo selektywny N - nieselektywny

Zastrzeżenia prawne

Informacje zawarte w prowadzonej przez firmę Koppert bazie danych efektów ubocznych służy jako wytyczne do oceny wpływu pestycydów na organizmy pożyteczne. Efekty występujące w konkretnych sytuacjach w praktyce mogą odbiegać od wymienionych w Bazie danych efektów ubocznych, ponieważ są one uzależnione od wielu czynników, takich jak liczba aplikacji, zastosowana ilość substancji czynnej, temperatura, nasłonecznienie, faza uprawy, rodzaj podłoża itp. Koppert i PP.H.U. FLOS nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki związane z wykorzystywaniem informacji zawartych w tym wykazie potrzebujesz porady skontaktuj się ze specjalistą z Koppert.

Przed wprowadzeniem biologicznej ochrony roślin oraz po aplikacji produktów firmy Koppert należy kontrolować wpływ pestycydów.

[Najlepszą formą kontroli jest aplikacja pod adresem kliknij](#)