

Dane aktualne na dzień: 20-10-2026 00:29

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/entomite-m-10-000szt-p-1513.html>



ENTOMITE-M - Stratiolaelaps scimitus 10 000 szt. (drapieżny roztocz)

Cena	139,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Entomite-M-10.000
Producent	KOPPERT
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.
[Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.](#)

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

ENTOMITE-M - Stratiolaelaps scimitus 10 000 szt.

Biologiczne zwalczanie ziemiórek i wciornastków w podłożu

ENTOMITE-M zawiera 10 000 drapieżnych roztoczy Stratiolaelaps scimitus, żyjących w glebie i aktywnie polujących na szkodniki strefy korzeniowej.

To naturalne rozwiązanie do ograniczania populacji ziemiórek oraz poczwerek wciornastków w uprawach pod osłonami, w szkółkach oraz w roślinach doniczkowych.

Roztocz działa tam, gdzie opryski nie docierają - w glebie, przy podstawie łodyg i w strefie korzeni.

Na jakie szkodniki działa ENTOMITE-M?

Preparat przeznaczony jest do zwalczania:

- jaj, larw i poczwerek ziemiórek
- poczwerek wciornastków
- wybranych drobnych organizmów glebowych, m.in. skoczogonków

Roztocz preferuje młodsze stadia larwalne ziemiórek, dlatego najlepiej sprawdza się we wczesnym etapie rozwoju populacji szkodnika.

Najczęściej stosowany jako biologiczna ochrona podłoża przed ziemiórkami.

Jak działa Stratiolaelaps scimitus?

To drapieżny roztocz glebowy.

- aktywnie porusza się w podłożu
- wyszukuje ofiarę
- żeruje na larwach i poczwarkach

Efekt nie jest natychmiastowy jak przy chemii, ale populacja szkodników zmniejsza się systematycznie i stabilnie.

Roztocza bytują w glebie, na jej powierzchni oraz u podstawy roślin.

Specyfikacja produktu

- **Opakowanie:** kartonowy cylinder
- **Zawartość:** 10 000 roztoczy we wszystkich stadiach rozwoju
- **Nośnik:** Mech Sphagnum spp..
- **Forma:** sypki materiał do rozsypywania na podłoże

Jak stosować ENTOMITE-M?

1. Przed użyciem obrócić pojemnik i delikatnie wstrząsnąć.
2. Rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby lub podłoża.
3. Nie aplikować bezpośrednio na rośliny.
4. Nie wysypywać przy samej łodydze w sposób punktowy.

Produkt należy zawsze aplikować na powierzchnię podłoża.

Możliwa aplikacja ręczna lub przy użyciu urządzeń Natutec Mini-Airbug, Natutec Airbug, Natutec Airobug.

Dawkowanie

Zalecana dawka:
100-500 roztoczy na m²

Dokładna ilość zależy od:

- presji szkodnika
- typu podłoża
- warunków klimatycznych
- rodzaju uprawy

Preparat można stosować prewencyjnie lub po zauważeniu pierwszych objawów obecności ziemiórek.

	dawka	m ² /opakowanie	odstęp (dni)	częstotliwość
zapobiegawczo	100/m ²	100	-	1x
małe nasilenie	200/m ²	50	-	1x
duże nasilenie	500/m ²	20	-	1x

Warunki skutecznego działania

- minimalna temperatura podłoża: 15°C
- gleba powinna być wilgotna i przepuszczalna
- najlepiej sprawdza się podłoże z dużą zawartością materii organicznej

W suchym, zbitym podłożu skuteczność będzie niższa.

Łączenie z innymi produktami biologicznymi

W celu zwalczania wciornastków produkt ENTOMITE-M powinien być łączony z:

- Amblydromalus limonicus
- Amblyseius andersoni
- Amblyseius swirskii
- Neoseiulus cucumeris
- Orius spp.

Takie połączenie pozwala objąć ochroną zarówno glebę, gdzie ENTOMITE-M ogranicza poczwarki, jak i część nadziemną roślin, gdzie działają drapieżne roztocza i pluskwiaki.

Dlaczego warto wybrać ENTOMITE-M?

- działa w glebie, gdzie chemia często zawodzi
- nie powoduje odporności szkodników
- wspiera biologiczną równowagę w uprawie
- bezpieczny dla roślin przy prawidłowym stosowaniu
- może być elementem integrowanej ochrony roślin

To rozwiązanie dla osób, które chcą ograniczyć chemiczne zabiegi i kontrolować populację ziemiórek w sposób naturalny.

Przechowywanie i trwałość

Produkt zawiera żywe organizmy.

- Czas przechowywania po odbiorze: 1-2 dni
- Temperatura: 10-15°C
- Przechowywać w ciemnym miejscu
- Pojemnik ułożyć w pozycji leżącej

Ze względu na bardzo krótki okres trwałości zaleca się zamawianie produktu bezpośrednio przed planowaną aplikacją.

Więcej informacji

ENTOMITE-M - *Stratiolaelaps scimitus*

Nazwa naukowa: *Stratiolaelaps scimitus*

Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Zastosowanie:

- Drapieżny roztocz żyjący w glebie

Entomite-M zawiera drapieżnego roztocza *Stratiolaelaps scimitus* jest przeznaczony do zwalczania jaj, larw i poczwarek ziemiórek, przy czym roztocz

preferuje mniejsze larwy. Wykazuje również pewne działanie w stosunku do innych szkodników glebowych, takich jak poczwarki wciornastków, skoczogonków

Sposób działania

Drapieżne roztocza żerują na larwach ziemiórek, poczwarkach wciornastków i innych owadach glebowych. Roztocza występują w glebie, na jej powierzchni i u podstawy łodyg roślin. Redukcja populacji szkodników przebiega powoli, ale w stałym tempie.

Wygląd produktu: Opakowania kartonowe

Nośnik: Torf

Stosowanie:

- Przed użyciem należy obrócić pojemnik i delikatnie wstrząsnąć.
- Rozprowadzić materiał równomiernie na glebie lub podłożu (nie na plastiku).

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Entomite-M zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw, podłoża oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 100 do 500 osobników na każdy m² na aplikację. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Entomite-M	Dawka	m ² z opakowania	Odstęp Dni	częstotliwość
Zapobiegawcz o	100/m ²	100	-	1x
Małe nasilenie	200/m ²	50	-	1x
Duże nasilenie	500/m ²	20	-	1x

Warunki środowiskowe

Optymalne wyniki uzyskuje się, gdy gleba jest wilgotna i luźna, o dużej zawartości materii organicznej. Temperatura minimalna do skutecznego stosowania produktu Entomite-M to 15°C/59°F.

Zastosowania z innymi produktami

W celu zwalczania wciornastków produkt Entomite-M powinien być łączony z drapieżnymi roztocznymi (*Amblydromalus limonicus*, *Amblyseius andersoni*, *Amblyseius swirskii*, *Neoseiulus cucumeris*) bądź *Orius* spp.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze:

1-2 dni.

Temperatura przechowywania:

10-15°C/50-59°F.

Warunki przechowywania:

Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Źródło opisu strona producenta

<http://www.koppert.pl/>

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)