

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/entonem-500-m-steinernema-feltiae-500-mln-nicieni-p-789.html>



ENTONEM 500 M - Steinernema feltiae 500 mln nicieni

Cena	581,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	K-Entonem-500M
Producent	KOPPERT
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

ENTONEM 500 M - Steinernema feltiae 500 mln nicieni

Steinernema feltiae - pasożytniczy nicień

Zastosowanie:

Larwy muchówek (Diptera): **ziemiórki** (Lycoriella spp., Bradysia spp.); wodarkowate (Scatella spp.); miniarki (Liriomyza spp.)
Poczwarki i larwy wciornastków (Thysanoptera): wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis)
Larwy ryjkowców (Coleoptera): opuchlak truskawkowiec (Otiorynchus sulcatus i inne gatunki z rodzaju Otiorynchus
Gąsienice (Lepidoptera): skośnik pomidorowy (Tuta absoluta); korowódka dębówka (Thaumetopoea processionea); jerzyk pospolity (Korscheltellus lupulina); sówkowate: Spodoptera spp.; sówka bawełnówka egipska (Spodoptera littoralis);
słonecznica orężówka (Helicoverpa spp.); błyszczka (Chrysodeixis chalcites); rolnica gwoździówka (Agrotis spp.); błyszczka jarzynówka (Autographa gamma)
Pluskwiaki (Hemiptera): prześwietlik platanowy (Corythucha ciliata)

Opakowanie:

woreczek w kartonie.

Zawartość:

500 mln (w dwóch torebkach) - 2 x 250 mln larw trzeciego stadium rozwojowego z obojętnym wypełniaczem

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce "Więcej informacji" na karcie tego produktu

Sposób stosowania:

- Aplikacja przez podlewanie, system nawadniający lub opryskiwacz silnikowy
- By nie dopuścić do powstawania zatorów, należy usunąć wszystkie filtry
- Ciśnienie robocze nie może przekraczać 12 bar
- Stosować dysze o średnicy min. 0,5 mm (500 mikronów)
- Równomiernie spryskać całą powierzchnię uprawy roztworem
- Należy cały czas mieszać roztwór, by zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza.

Aplikacja dogłębowa - przeciw ziemiórkom i poczwarkom wciornastka

- Dawka 0,25-1 mln nicieni/ m²
- Ilość cieczy roboczej zależy od sposobu aplikacji
- Rośliny należy podlać przed i po zabiegu
- Przez pierwsze 2 tygodnie po zabiegu utrzymywać wysoką wilgotność podłoża.

Aplikacja na liście - przeciw larwom wciornastków

- Należy zastosować 0,25 mln nicieni/ m² rozpraszając je w 0,125 l roztworu roboczego (=1.250 l/ha)
- Do roztworu dodać adjuwant, by zwiększyć skuteczność zabiegu
- Spryskać rośliny równomiernie roztworem ENTONEM
- Zabieg powtarzać co tydzień, jak długo będzie to konieczne.

Sposób działania:

Nicienie dostają się do wnętrza larw ziemiówek przez naturalne otwory ciała (otwór gębowy, odbytowy lub przetchlinki) i tam żerują. Z przewodu pokarmowego nicieni uwalniają się wówczas specyficzne bakterie, które rozpraszają się wewnątrz ciała owada, intensywnie się namnażając. Bakterie te rozkładają tkanki gospodarza na substancje, które mogą zostać łatwo pobrane przez nicienie. Larwa ziemiórki ginie w ciągu kilku dni.

Porażone larwy przybierają kolor żółty do brązowego i stają się śluzowate, przez co trudno je zauważyć w podłożu.

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !



✓ Zasady zakupów i dostaw:

Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona roślin" [kliknij tutaj](#)

✓ Towary z działu "Biologiczna ochrona roślin" wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami dostępnymi w sklepie. Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Więcej informacji

Entonem - Steinernema Feltiae

Nazwa naukowa: Steinernema feltiae
Rodzaj organizmu: Nicienie będące pasożytami owadów
Kategoria produktu: Biologiczny wróg szkodników

Do zwalczania różnych szkodników w uprawach pod osłonami oraz na miejskich terenach zielonych

Stadium rozwoju: Zainfekowane larwy trzeciego stadium (L3).
Steżenie: 86% Steinernema feltiae – 14% obojętny biodegradowalny materiał nośny.

JAK STOSOWAĆ ?

Można aplikować za pomocą produktu Aquanemix dostępnego w sklepie internetowym

Przygotowanie:

- Wyjąć saszetki z pudełka i pozostawić w temperaturze pokojowej na 30 minut.
- Zawartość saszetek wsypać do wiadra zawierającego co najmniej 2 litry wody na saszetkę (temperatura wody: 15-20°C/59-68°F).
- Dobrze wymieszać i odczekać 5 minut, aż produkt nasiąknie.
- Ponownie wymieszać i wlać zawartość do napełnionego do połowy zbiornika opryskiwacza (z wyjątkiem mieszanek zbiornikowych z kompatybilnym preparatem).
- Nieustannie mieszać roztwór w zbiorniku (np. przy pomocy pompy recyrkulacyjnej).
- Uzupełnić zbiornik opryskiwacza odpowiednią ilością wody.
- W przypadku mieszanki zbiornikowej z kompatybilnym preparatem dodać Entonem na końcu, do całkowicie napełnionego zbiornika.
- Stosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu do oprysku.

Stosowanie:

- Nicienie można aplikować za pomocą konewki, rozpylacza, zraszacza, opryskiwaczy plecakowych i pojazdowych.
- Aby nie dopuścić do powstawania zatorów, należy usunąć wszystkie filtry, zwłaszcza jeśli mają one mniej niż 0,3 mm (50 mesh).
- W przypadku dyszy ciśnienie robocze nie może przekraczać 20 barów/290 psi.
- Stosować dysze o średnicy min. 0,5 mm (500 mikronów – 35 mesh). Preferowane są stożkowe dysze zraszające o dużej przepustowości.
- Należy przez cały czas mieszać roztwór, aby zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza.
- Unikać spryskiwaczy wyposażonych w pompy odśrodkowe lub tłokowe.
- Temperatura wody w zbiorniku nie może przekraczać 25°C/77°F, a pH musi wynosić od 4 do 8.
- Równomiernie spryskać roztworem powierzchnię gleby/podłoża.

Stosowanie w systemach nawadniających:

- Zaleca się stosowanie systemów nawadniania z kompensacją ciśnienia. Jeśli takie rozwiązanie nie jest dostępne, zaleca się opryskiwanie lub zraszanie. W przypadku korzystania z systemu Dosatron/Venturi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Koppert w celu uzyskania szczegółowych porad.
- Niezwłocznie po przygotowaniu roztworu należy go zużyć (najpóźniej w ciągu 5 godzin). Niewskazane jest przechowywanie wymieszanego roztworu.

Dawkowanie

Entonem stosuje się zazwyczaj w dawce od 250 000 do 500 000 nicieni na m²

w przypadku rozpraszania na glebę oraz od 1 do 3 milionów nicieni na litr w przypadku rozpraszania na liście. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z etykietą produktu.

Czas stosowania

Czas i częstotliwość stosowania zależą od gatunku szkodnika i środowiska uprawy – wilgotności względnej, wilgotności gleby i temperatury. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

- *Steinernema feltiae* sprawdza się najlepiej w temperaturach w zakresie 14-26°C/57-79°F
- Temperatura gleby lub powietrza poniżej 5°C/41°F lub powyżej 35°C/95°F może być śmiertelna dla nicieni.
- Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozpraszать przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
- Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed aplikacją i bezpośrednio po niej.
- W przypadku stosowania na liściach produkt Entonem należy stosować do oprysków, gdy wilgotność względna powietrza przekroczy 75%. Po zakończeniu oprysku utrzymywać wilgotność na tym poziomie przez kilka godzin.
- Dodanie adiuwanta lub środka utrzymującego wilgotność / powstrzymującego wysychanie może przynieść dodatkowe korzyści. Poproś swojego przedstawiciela/dystrybutora firmy Koppert o więcej informacji.
- Spryskiwać wieczorem (lub w niektórych przypadkach rano), pozwalając, aby nicienie pracowały przez kilka godzin przy optymalnej temperaturze i wilgotności, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

DAWKOWANIE					
ENTONEM	Dawka	m ² / opakowanie	odstęp dni	częstotliwość	
zapobiegawczy	-	-	-	-	
małe nasilenie	500.000/m ²	1000m ²	-	1x	
duże nasilenie	500.000/m ²	1000m ²	7	2-3x	

Zgodność

- Produkt jest bezpieczny dla większości pożytecznych owadów i roztoczy, ale w przypadku opryskiwania liści bezpośredni kontakt z produktem może być szkodliwy dla niektórych gatunków. Dowiedz się, jakie są skutki uboczne działania tego produktu na pożyteczne owady i roztocza
- Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą mieszanek zbiornikowych należy zawsze dodawać niczenie do całkowicie wypełnionego zbiornika zawierającego kompatybilny preparat.

Skutki uboczne

[Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu. Sprawdź w bazie](#)

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze: Data ważności na opakowaniu należy zamawiać na bieżące zastosowanie

Temperatura przechowywania: Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C (35-43°F) w wentylowanej lodówce/chłodni.

Warunki przechowywania: Po odbiorze produktu należy wyjąć opakowania z izolacyjnego opakowania transportowego. Do czasu użycia przechowywać w ciemnej, wentylowanej lodówce/chłodni.

Źródło opisu strona producenta

<http://www.koppert.pl/>

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)