Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:04

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/larvanem-500-mln-nicieni-p-787.html





LARVANEM 500 mln nicieni - Heterorhabditis bacteriophora

Cena	**610,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Larvanem-500M**
Producent	**KOPPERT**
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

Uwaga ! Ostatnie zamówienia na dostawy Larvanem na ten sezon przyjmujemy 14.09.2026 z uwagi na coraz niższe temperatury.
Jeśli jest konieczność zastosowania nicieni w niższych temperaturach można zastosować produkt > ENTONEM <

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

LARVANEM 500 mln nicieni - Heterorhabditis bacteriophora

✔ **Heterorhabditis bacteriophora - pasożytniczy nicień.**
✔ Larvanem 500mln - opakowanie wystarczające na 500-1000m^2 uprawy

Zachęcamy do zapoznania się z obszernym artykułem o stosowaniu nicieni Larvanem. Znajdują tam się istotne informacje o rozpoznaniu szkodnika, najlepszych terminach stosowania czy najczęściej zadawanych pytanich > Ten artykuł może być

pomocny w uniknięciu błędów najczęściej popełnianych przez Klientów oraz ułatwić decyzję o zakupie <

CZYM JEST PRODUKT LARVANEM I CZY WARTO GO STOSOWAĆ ?

Larvanem to innowacyjne pasożytnicze nicienie Heterorhabditis bacteriophora, które **wnikając do wnętrza larwy opuchlaka paraliżują jego organizm następnie uwolnione bakterie powodują rozkładanie się tkanki larwy szkodnika.** Tak porażona larwa ginie w ciągu kilku dni od zainfekowania, a nicienie larvanem przenikają do gleby poszukując nowych larw szkodnika. Z czasem nie mając pożywienia giną.

Nicienie są całkowicie bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska,a co ważne szkodniki nie uodparniają się na nie jak na środki chemiczne, który przestały być już skuteczne w walce z tym szkodnikiem.

Bardzo ważny jest też fakt, że **nicienie nie hamują rozwoju roślin** co miało ogromny wpływ w przypadku używania środków chemicznych do walki ze szkodnikiem.

CO WYRÓŻNIA NICIENIE LARVANEM OD PODOBNYCH PRODUKTÓW NICIENIOWYCH INNYCH FIRM ?

Przede wszystkich ważny jest wypełniacz zastosowany w produktach Koppert. Inne nicienie często posiadają wypełniacz w postaci glinki, która gorzej rozpuszcza się w wodzie i w przypadku stosowania np. poprzez systemy nawadniające może powodować ich zapychanie poprzez tworzący się osad. W przypadku nicieni firmy Koppert wypełniaczem jest specjalny żel, który bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie nie tworząc osadów, a do tego jest w pełni biodegradowalny. Nawet rozpuszczone w mniejszej ilości wody nie wystąpi osad, a wszystko bardzo ładnie się rozpuści. Dzięki temu możemy podawać nicienie nawet przez system nawadniania co nie spowoduje jego zapychania.

Zapytaj zatem sprzedającego przed zakupem jaki wypełniacz stosuje w swoim produkcie nicieniowym .

LARVANEM 500 mln nicieni - dawka od 500 - 1000m^2

Zastosowanie:
Do zwalczania larw chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych, np. opuchlaka truskawkowca Otiorhynchus sulcatus.

Opakowanie:
woreczek w kartonie zawiera pożyteczne nicienie Heterorhabditis bacteriophora

Zawartość:
500 mln (w dwóch torebkach) - 2 x 250 milionów larw trzeciego stadium rozwojowego z obojętnym wypełniaczem

Dodatkowe informacje o produkcie:
Dostępne w zakładce ''Więcej informacji'' na karcie produktu
Film: film prezentujący produkt Larvanem znajdziesz na karcie tego produktu w zakładce "Klipy filmowe"
> Zobacz artykuł LARVANEM co warto wiedzieć o nicieniach w walce z opuchlakami i pędrakami ?<

Zobacz film
Produkt prezentowany w programie Maja w ogrodzie (odc. 418 Długi i wąski ogród 13:00 minuta)

UWAGI DO STOSOWANIA NICIENI LARVANEM

✔**Opuchlaki** - preparat **należy zastosować dwa razy: wiosną (koniec kwietnia-maj)** oraz **drugi zabieg nowo zakupionym preparatem (koniec sierpnia-wrzesień)** aby zwalczyć wszystkie stadia larwalne. (**W walce z pędrakiem stosujemy latem optymalny termin od lipca maksymalnie do połowy sierpnia** - zwalczamy tylko młode tegoroczne larwy. Nicienie nie niszczą starszych larw pędraków !) - stosować tylko po własnych obserwacjach

✔ Pamiętaj, że istotna jest temperatura gleby, której średnia amplituda dobowa musi wynosić minimum 14˚C. Jeśli temperatura jest troszkę niższa, a mamy konieczność zastosowania można w ostateczności zastosować produkt Entonem

✔ Larvanem wprowadzamy się do gleby przez podlewanie (przed aplikacją dobrze podlać podłoże)

✔ Unikać aplikacji w pełnym słońcu

✔ **Środek aplikować na wilgotną glebę i utrzymywać wilgotność przez minimum 2 tygodnie.** Ważne jest aby nicienie jak najszybciej znalazły się w glebie, gdyż mogą się poruszać tylko w wilgotnym podłożu. Nie dokładnie wpłukane giną na słońcu lub wysychają

✔ Należy cały czas mieszać roztwór, by zapobiec osiadaniu nicieni na dnie zbiornika opryskiwacza

✔ Przed zakupem każdy powinien wykonać własne obserwacje występowania larw szkodnika (w rożnych rejonach kraju cykl rozwojowy może być różny). Larvanem niszczy tylko larwy nie dorosłe osobniki zwalcz larwy opuchlaków przed ich przepoczwarczeniem

✔ Nie zalecamy przechowywania. Produkt zamawiać na bieżące użycie! Data ważności około 2 tygodnie

✔ Małe opakowanie 50mln wystarczy na około 100m^2 (produkt sprzedajemy również w większym opakowaniu 500mln na około 1000m^2)

LARVANEM TO DOSKONAŁY PRODUKT DO WALKI Z OPUCHLAKAMI I PĘDRAKAMI ALE ...

Istotne są terminy stosowania. Ten sam produkt na różne szkodniki stosuje się w odmiennych terminach:

Larwy opuchlaka kiedy stosować nicienie ?



Opuchlaki zwalczamy dwoma zabiegami pierwszą aplikację nicieniową stosujemy koniec kwietnia i maj, druga aplikacja nowo zakupionym produktem koniec sierpnia/wrzesień (wymagana temperatura gleby +14stopni C).

Larwy pędraków kiedy stosować nicienie ?



Pędraki optymalny termin walki to okres od lipca do maksymalnie połowy sierpnia i walka z nim odbywa się około 3 lata z rzędu.

**ZAMÓW U NAS A DOSTARCZYMY NICIENIE
W ODPOWIEDNI I BEZPIECZNY SPOSÓB !**

Więcej informacji

Koppert DYSTRYBUTOR OGRODNIK 1993 sklep-ogrodnik.pl

LARVANEM - Heterorhabditis bacteriophora - pasożytniczy nicień

Do czego stosujemy Larvanem?

Produkt Larvanem służy do biologicznego zwalczania następujących szkodników:

Chrząszcze – Larwy ryjkowców
Opuchlak truskawkowiec (Otiorhynchus sulcatus i inne gatunki z rodzaju Otiorhynchus)

Chrząszcze
Chrabąszcz majowy (Amphimallon majale)
Ogrodnica niszczylistka(Phyllopertha horticola ichrząszcze z rodzaju Phyllophaga)
Amphimallon solstitialis, Hoplia philantus
Popilia japońska i chrząszcz azjatycki(Popillia japonica, Exomala orientalis, Autoserica castanea)
Listnik zmiennobarwny(Anomala dubia)
Serica brunnea, chrząszcze z rodzaju Hopliai żuki gnojowe z rodzaju Aphodiusoraz młode larwy chrząszczy Melolontha melolontha, Amphimallon aestivus i Anoxia villosa

Stonkowate

Larwy pchełek ziemnych (Phyllotreta)

Motyle
Larwy jerzyka pospolitego(Korscheltellus lupulina)

Jak działa produkt Larvanem?

Nicienie dostają się do wnętrza szkodnika, a następnie uwalniają w jego ciele symbiotyczne bakterie. Bakterie te przekształcają tkankę larwy w źródło pożywienia, na którym posilają, rozwijają i rozmnażają się nicienie. Po zaatakowaniu szkodnik umiera w ciągu kilku godzin lub dni. Zaatakowany szkodnik przybiera kolor czerwony do brązowego. Przez większość czasu pozostaje trudny do zauważenia, ponieważ szybko ulega rozkładowi.

Specyfikacja produktu

Zawiera: nicienie entomopatogeniczne z obojętnym materiałem nośnym 86% Heterorhabditis bacteriophora, 14% obojętny materiał nośny

Larvanem jak stosować ?

Można aplikować za pomocą dozownika Aquanemix dostępnego w sklepie internetowym

Dozowanie - szkodniki glebowe

Larwy szkodników w glebie			
Dawka	50 milionów nicieni	500 milionów nicieni	Opuchlaki 1 aplikacja: kwiecień/maj 2 aplikacja: sierpień/wrzesień Pędraki 1 aplikacja: lipiec/sierpień
500 000 nicieni/m	100 m^2	1 000 m^2	

Ważne:

✔Po zastosowaniu konieczne nawodnienie
✔Zalecana minimalna ilość preparatu na aplikację (nie uwzględnia nawodnienia przed i po): 100 l/100 m^2 (10 000 l/ha)
✔Jeśli średnia temperatura gleby wynosi poniżej 14°C, stosować preparat Entonem

Optymalne warunki do stosowania produktu Larvanem

✔Optymalna temperatura wynosi od 19°C do 33°C. Temperatura poniżej 5°C i powyżej 35°C zmniejsza skuteczność produktu.
✔Kilka dni po zastosowaniu wilgotność gleby musi być utrzymywana na wysokim poziomie. Jeśli to możliwe, należy nawodnić uprawę przed aplikacją i bezpośrednio po niej.
✔Promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest szkodliwe dla nicieni, dlatego nie należy ich rozprowadzać przy bezpośrednim nasłonecznieniu.

Przechowywanie i zasady postępowania

✔Natychmiast po otrzymaniu przesyłki wyjąć pudełko z produktem z opakowania.
✔Przechowywać w temperaturze od 2°C do 6°C w wentylowanej lodówce / chłodnym pomieszczeniu.
✔Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu ''Biologiczna ochrona" kliknij tutaj