

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/snacol-05-gb-1kg-p-130.html>



SNACOL 3GB 1kg + 100g Skuteczny preparat na ślimaki - BROS

Cena	39,59 zł
Numer katalogowy	BROS-Snacol-1kg + 100g
Producent	BROS
Czas dostawy	1-7 dni roboczych

Opis produktu

SNACOL 3GB 1kg + 100g gratis Kartonik - BROS

- ✓ Zabezpiecza obszar do 1570m²
- ✓ Na ślimaki nagie i oskorupione

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Opis działania:

Moluskocyd w formie granulowanej przynęty przeznaczony głównie do zwalczania ślimaków nagich (w przypadku roślin ozdobnych również ślimaków oskorupionych) Środek zjedzony przez ślimaka powoduje jego odrętwienie, a następnie szkodnik ginie w wyniku odwodnienia organizmu.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zezwolenie MRiRWnr R-126/2021 z dnia 30.09.2021 r.

Zawartość substancji czynnej:

Metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu octowego) 26,5g/kg (2,65%)

Etykieta produktu

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

Opakowanie: 1kg + 100g gratis = 1,1kg

Więcej informacji

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i

informacje dotyczące produktu.

Środek zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu.

Stosowanie środka

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie poprzez aplikację bezpośrednią z opakowania lub za pomocą aplikatorów do granulowanych środków ochrony roślin. Należy go aplikować równomiernie na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych.

Truskawka w uprawie polowej

Ślimaki nagie

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g / 10m²

Termin stosowania: środek zastosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, w okresie rozwoju i dojrzewania owoców truskawki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Kapusta głowiasta (w uprawie polowej, uprawie szklarniowej i pod osłonami)

Ślimaki nagie

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g / 10m²

Termin stosowania: środek zastosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub sadzeniem roślin do fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Salata, szpinak, seler liściowy i inne warzywa liściowe (w uprawie polowej, uprawie szklarniowej i pod osłonami)

Ślimaki nagie

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g / 10m²

Termin stosowania: środek zastosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki, od 7 dni przed siewem lub

sadzeniem roślin do fazy gdy zostanie osiągnięte 10% masy liściowej charakterystycznej dla danej odmiany.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej, uprawie szklarniowej i pod osłonami)

Ślimaki nagie i wstężyk ogrodowy (ślimak oskorupiony)

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g / 10m²

Termin stosowania: środek zastosować po zaobserwowaniu ślimaków lub pierwszych szkód wyrządzonych przez te szkodniki.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zawartość substancji czynnej:

Metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu octowego) 26,5g/kg (2,65%) EUH 401 Celem uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Preparat niebezpieczny dla sów i innych zwierząt domowych. W przypadku podejrzenia spożycia przez zwierzęta natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii. Rozsypany przypadkowo preparat natychmiast znieść i usunąć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin mogą zostać zakupione jedynie przez osobę pełnoletnią oraz posiadającą kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony rośliny.