Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:19

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/spical-25-000-szt-dobroczynek-kalifornijski-neoseiulus-californicus-p-1449.html



SPICAL 25 000 szt Dobroczynek kalifornijski Neoseiulus californicus

Cena	**440,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**K-Spical-25000**
Producent	**KOPPERT**
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

SPICAL - Dobroczynek kalifornijski - Neoseiulus californicus 25 000 szt - drapieżny roztocz.

SPICAL to preparat biologiczny zawierający drapieżne roztocze Neoseiulus californicus, przeznaczony do zwalczania przędziorków oraz wybranych gatunków roztoczy w uprawach. Działa we wszystkich stadiach rozwoju szkodników, z preferencją młodszych form, co pozwala skutecznie ograniczać ich populację już na wczesnym etapie.

Produkt przeznaczony jest do zwalczania przędziorka chmielowca, przędziorka owocowca, czerwonego przędziorka cytrusowego, roztocza truskawkowca oraz roztocza szklarniowca. Nie należy stosować go na uprawach pomidorów.

Neoseiulus californicus dobrze sprawdza się w warunkach wysokiej temperatury oraz przy niższej wilgotności, wykazując wysoką skuteczność w szerokim zakresie warunków środowiskowych. Może być stosowany samodzielnie lub łączony z innymi organizmami pożytecznymi, w tym z Phytoseiulus persimilis oraz Feltiella acarisuga.

Drapieżne roztocza przebijają ofiary ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności, co prowadzi do skutecznej eliminacji szkodników.

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

Specyfikacja produktu

- **Wielkość opakowania:** 25 000 szt drapieżnych roztoczy we wszystkich ruchliwych stadiach rozwoju zmieszanych z obojętnym wypełniaczem.
- **Forma:** butelka 500 ml z końcówką dozującą
- **Nośnik:** wermikulit
- **Nazwa naukowa:** Neoseiulus californicus
- **Rodzaj organizmu:** Drapieżny roztocz

Zwalczane szkodniki

- Przędziorek chmielowiec Tetranychus urticae
- Przędziorek owocowiec Panonychus ulmi
- Przędziorek cytrusowy Panonychus citri
- Roztocz truskawkowiec Tarsonemus pallidus
- Roztocz szklarniowiec Polyphagotarsonemus latus

W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż Phytoseiulus persimilis

Sposób stosowania

- Przed użyciem należy obrócić butelkę i delikatnie nią wstrząsnąć.
- Wcisnąć środek nakrętki w celu otwarcia otworu dozującego.
- Rozprowadzić materiał bezpośrednio na liściach.

Zadbać o to, aby produkt pozostał na liściach przez co najmniej kilka godzin po aplikacji.
Produkt może być aplikowany przy użyciu urządzeń Natutec Airobreez, Natutec Mini Airbug, Natutec Airbug lub Natutec Airobug.

Warunki środowiskowe

- Optymalna temperatura działania wynosi od 13 do 32°C.
- Organizm jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 60 procent.

Dawkowanie

Spical	sztuk / na m^2	m2 / z opakowania	odstęp dni	częstotliwość	Uwagi
zapobiegawczo	25	1000	21	-	-
małe nasilenie	100	250	-	1x	stosować razem z preparatem Spidex
duże nasilenie	200	125	-	1x	stosować razem z preparatem Spidex

Dawkowanie zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz stopnia porażenia szkodnikami. Aplikację należy rozpocząć wraz z pojawieniem się pierwszych szkodników. Zalecane dawkowanie wynosi od 25 do 125 osobników na m2 na jedną aplikację. Zabieg należy powtórzyć co najmniej pięć razy w odstępach tygodniowych. W celu doboru optymalnej strategii zaleca się konsultację z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem.

Przechowywanie

Po otrzymaniu produkt można przechowywać przez 1 do 2 dni.

Temperatura przechowywania powinna wynosić od 8 do 10°C.
Produkt należy przechowywać bez dostępu światła, butelka w pozycji leżącej.

Ostrzeżenia
Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Więcej informacji

Spical - Dobroczynek kalifornijski - Neoseiulus californicus

Nazwa naukowa: Neoseiulus californicus
Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Zastosowanie:

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae); przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi); przędziorek cytrusowy (Panonychus citri) oraz inne gatunki przędziorka.

- Do zwalczania przędziorków. W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż Phytoseiulus persimilis

- Nie stosować na uprawach pomidorów.

Sposób działania

Drapieżne roztocza przechodzą na uprawy, gdzie przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Stosowanie:

- Przed użyciem należy obrócić butelkę i delikatnie nią wstrząsnąć.
- Rozprowadzić materiał na liściach.
- Zadbać o to, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
- Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spical zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 25 do 125 osobników na każdy m2 na aplikację. Aplikację należy powtórzyć co najmniej pięciokrotnie w odstępach tygodniowych. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

SPICAL	sztuk / na m^2	m^2 z opakowania	odstęp dni	częstotliwość	uwagi
zapobiegawczo	25	1000	21	-	-
male nasilenie	100	250	-	1x	stosować razem z preparatem Spidex
duże nasilenie	200	125	-	1x	stosować razem z preparatem Spidex

Warunki środowiskowe:

Neoseiulus californicus jest najbardziej skuteczny w temperaturach w zakresie od 13 do 32°C (55–90°F), jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z *Phytoseiulus persimilis* oraz *Feltiella acarisuga.*

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne:

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla

tego produktu

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze: 1–2 dni.
Temperatura przechowywania: 8-10°C/47-50°F.
Warunki przechowywania: Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Źródło opisu strona producenta
https://www.koppert.pl/spical/

Ważne informacje:
Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.
Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i FLOSEVA nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie.

zasady sprzedaży

Ważne, ten produkt podlega specjalnym zasadom sprzedaży i dostawy, przed zakupem zapoznaj się ze szczegółami, **kliknij tutaj**