

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/spical-dobroczynek-kalifornijski-neoseiulus-californicus-25-000-szt-p-1449.html>



SPICAL - Dobroczynek kalifornijski - Neoseiulus californicus 25 000 szt

Cena	435,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	K-Spical-25000
Producent	KOPPERT
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

SPICAL 25 000 szt

Dobroczynek kalifornijski - Neoseiulus californicus

Zastosowanie:

Produkt Spical zawierający drapieżny roztocz Neoseiulus californicus jest przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae), przędziorka owocowca (Panonychus ulmi), czerwonego przędziorka cytrusowego (Panonychus citri), roztocza truskawkowca (Tarsonemus pallidus) i roztocza szklarniowca (Polyphagotarsonemus latus) we wszystkich stadiach rozwoju, z preferencją młodszych. Nie stosować na uprawach pomidorów.

Dobroczynek kalifornijski (Phytoseiulus californicus) - drapieżny roztocz.

Opakowanie:

Butelka o pojemności 500 ml z końcówką dozującą

Zawartość:

Zawiera 25 000 drapieżnych roztoczy we wszystkich ruchliwych stadiach rozwoju zmieszanych z obojętnym wypełniaczem.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce " Więcej informacji " na karcie tego produktu

Przechowywanie po dostawie:

Po otrzymaniu przechowywać produkt przez 1-2 dni w temperaturze 8-10°C, bez dostępu światła. Butelki muszą się przez cały czas znajdować w pozycji leżącej.

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !



✓ **Zasady zakupów i dostaw:**

[Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona" kliknij tutaj](#)

✓ **Towary z działu "Biologiczna ochrona roślin" wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami dostępnymi w sklepie.** Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Więcej informacji

Spical - Dobroczynek kalifornijski - Neoseiulus californicus

Nazwa naukowa: Neoseiulus californicus

Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Zastosowanie:

Przędziorek chmielowiec (*Tetranychus urticae*); przędziorek owocowiec (*Panonychus ulmi*); przędziorek cytrusowy (*Panonychus citri*) oraz inne gatunki przędziorka.

- Do zwalczania przędziorków. W wysokich temperaturach i przy niskiej wilgotności sprawdza się lepiej niż *Phytoseiulus persimilis*
- Nie stosować na uprawach pomidorów.

Sposób działania

Drapieżne roztocza przechodzą na uprawy, gdzie przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Stosowanie:

- Przed użyciem należy obrócić butelkę i delikatnie nią wstrząsnąć.
- Rozprowadzić materiał na liściach.
- Zadbaj o to, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
- Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spical zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 25 do 125 osobników na każdy m² na aplikację. Aplikację należy powtórzyć co najmniej pięciokrotnie w odstępach tygodniowych. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

SPICAL	sztuk / na m ²	m ² z opakowania	odstęp dni	częstotliwość	uwagi
zapobiegawczo	25	1000	21	-	-
małe nasilenie	100	250	-	1x	stosować razem z preparatem Spidex
duże nasilenie	200	125	-	1x	stosować razem z preparatem Spidex

Warunki środowiskowe:

Neoseiulus californicus jest najbardziej skuteczny w temperaturach w zakresie od 13 do 32°C (55–90°F), jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z *Phytoseiulus persimilis* oraz *Feltiella acarisuga*.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne.

W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne:

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze: 1-2 dni.
Temperatura przechowywania: 8-10°C/47-50°F.
Warunki przechowywania: Bez dostępu światła, butelka powinna być ułożona w pozycji leżącej.

Źródło opisu strona producenta

<https://www.koppert.pl/spical/>

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.

Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i P.P.H.U. FLOS nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)