

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/spical-plus-100-saszetek-p-778.html>



SPICAL PLUS 100 torebek - Neoseiulus californicus - Dobroczynek kalifornijski

Cena	355,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Spical+100
Producent	KOPPERT
Zasady zakupu / Terminy dostaw	Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki. Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

SPICAL PLUS 100 saszetek - Dobroczynek kalifornijski - Neoseiulus californicus

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

[Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.](#)

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy



Dobroczynnik kalifornijski (*Phytoseiulus californicus*) - drapieżny roztocz.

Zastosowanie:

Produkt Spical zawierający drapieżny roztocz *Neoseiulus californicus* jest przeznaczony do zwalczania przędziorka chmielowca (*Tetranychus urticae*), przędziorka owocowca (*Panonychus ulmi*), czerwonego przędziorka cytrusowego (*Panonychus citri*), roztocza truskawkowca (*Tarsonemus pallidus*) i roztocza szklarniowca (*Polyphagotarsonemus latus*) we wszystkich stadiach rozwoju, z preferencją młodszych.

- Nie stosować na uprawach pomidorów.

Opakowanie:

papierowe saszetki z zawieszka 100 sztuk

Zawartość:

Saszetka papierowa z zawieszka zawiera 100 drapieżnych roztoczy oraz roztocza magazynowe (we wszystkich stadiach rozwoju) zmieszane z otrębami.

Produkt prezentowany w programie "Maja w ogrodzie"

["Swojski ogródek w ruchliwej Warszawie \(odc. 422\)" zobacz film kliknij](#)

Przechowywanie:

Środki biologiczne nie nadają się do długotrwałego przechowywania należy je jak najszybciej wprowadzić do uprawy. (Środki biologiczne należy zamawiać na bieżące zastosowanie)

- Po otrzymaniu produkt można przechowywać maksymalnie przez 1-2 dni w temperaturze 17-20°C, bez dostępu światła słonecznego. Należy zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO₂.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce "Więcej informacji" na karcie tego produktu

Nasze uwagi:

Dobroczynnik ten jest ciepłolubny i nie zimuje w naszych warunkach dlatego jeśli chcesz zastosować produkt na zewnątrz musi panować odpowiednia temperatura (zimno zabije dobroczynnika). Przy stosowaniu na zewnątrz, konieczne zabezpieczyć saszetki przed deszczem. Dobroczynnik Kalifornijski toleruje wysokie temperatury i niską wilgotność. Nadaje się do stosowania, gdy temperatura przekracza 10°C nocą.

Więcej informacji

Spical Plus -Neoseiulus californicus - Dobroczynnik kalifornijski

UWAGA w sprzedaży dostępne są nowe nowoczesne saszetki > [Spical Ulti-Mite](#)

Czym różnią się saszetki Spical Ulti-Mite od Spical Plus ?

Saszetki Spical Ulti-Mite wykonane są ze specjalnego plastiku, który ulega biodegradacji, nadają się do kompostowania. W saszetkach takich utrzymywana jest lepsza wilgotność co jest bardzo korzystne dla pożytecznych organizmów znajdujących się wewnątrz. Zwykle saszetki wykonane z papieru szybko przesychają co skraca działanie środka. Przy optymalnych warunkach 60% wilgotności i temperaturze 19 stopni C z saszetki Ulti-Mite możemy uzyskać nawet 2,5-3 raza więcej pożytecznych roztoczy poprzez lepsze warunki wewnątrz saszetki.

Spical Plus -Neoseiulus californicus - Dobroczynnik kalifornijski

Nazwa naukowa: Neoseiulus californicus

Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Na jakie szkodniki ?

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae); przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi); przędziorek cytrusowy (Panonychus citri) oraz inne gatunki przędziorka.

Rodzaje upraw: Nie stosować na uprawach pomidorów.

Sposób działania:

Drapieżne roztocza opuszczają saszetki i przechodzą na uprawy, gdzie przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Na jakie szkodniki ?

Przędziorek chmielowiec (Tetranychus urticae); przędziorek owocowiec (Panonychus ulmi); przędziorek cytrusowy (Panonychus citri) oraz inne gatunki przędziorka.

Rodzaje upraw: Nie stosować na uprawach pomidorów.

Sposób działania:

Drapieżne roztocza opuszczają saszetki i przechodzą na uprawy, gdzie przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Stosowanie:

- Zawiesić saszetki w osłoniętych miejscach na roślinach z dala od bezpośredniego dostępu światła słonecznego.
- Saszetki mają już przygotowany otwór, przez który wydostają się roztocza.
- Trzymać saszetki za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Spical-Plus zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się na uprawach pierwszych przędziorków. Stosować co najmniej 4000 saszetek na hektar i rozwieszać je w równych odstępach w uprawie.

Powtórzyć po 4 tygodniach, jeśli pierwszy zabieg nie spowoduje zwalczenia szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

	saszetek na m ²	odstęp dni	Uwagi
zapobiegawczo	1 saszetka na 2,5m ²	28-42	
małe nasilenie	1 saszetka na 2,5m ²	28	stosować razem z preparatem Spidex
duże nasilenie	1 saszetka na 1m ²	28	stosować razem z preparatem Spidex

Warunki środowiskowe

Neoseiulus californicus jest najbardziej skuteczny w temperaturach w zakresie od 13 do 32°C (55–90°F), jest wrażliwy na wilgotność względną poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Produkt może być łączony z Phytoseiulus persimilis oraz Feltiella acarisuga.

Skutki uboczne

[Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu.](#)

Postępowanie z produktem

- Czas przechowywania po odbiorze: 1-2 dni.
- Temperatura przechowywania: 17-20°C/63-68°F.
- Warunki przechowywania: Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO₂.

Źródło opisu strona producenta

<https://www.koppert.pl/spical-plus/>

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.

Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i FLOSEVA nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie.