

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/swirski-mite-50000-szt-amblyseius-swirskii-drapiezny-roztocz-p-1436.html>



SWIRSKI-MITE 50.000 szt - Amblyseius swirskii - drapieżny roztocz.

Cena	360,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	K-Swirski-Mite
Producent	KOPPERT
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

SWIRSKI-MITE 50.000 szt - Amblyseius swirskii

Amblyseius swirskii - drapieżny roztocz

Zastosowanie:

Do zwalczania młodych larw różnych gatunków wciornastków oraz jaj i larw mączlików (*Trialeurodes vaporariorum* i *Bemisia tabaci*). Produkt SWIRSKI-MITE może być stosowany w różnych uprawach warzywniczych i ozdobnych, z wyjątkiem pomidorów.

Opakowanie:

butelka 500 ml

Zawartość:

50 000 drapieżnych roztoczy (nimf i osobników dorosłych) zmieszanych z otrębami.

Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce " Więcej informacji " na karcie tego produktu

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !



Zasady zakupów i dostaw:

Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona roślin" [kliknij tutaj](#)



Towary z działu "Biologiczna ochrona roślin" wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami dostępnymi w sklepie. Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Więcej informacji

Swirski-Mite - Amblyseius swirskii

Nazwa naukowa: Amblyseius swirskii

Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Zastosowanie:

Młode larwy różnych gatunków wciornastków, jaja i larwy mączlika.

- Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą
- Amblyseius swirskii może odżywiać się także pyłkiem słodkiej papryki i oberżyny
- Dawki prewencyjne należy stosować dopiero, gdy kwitnienie roślin jest zaawansowane
- Nie stosować na uprawach pomidorów.

Sposób działania:

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Wielkość opakowania: 50 000 drapieżnych roztoczy.

Wygląd produktu: Butelka 500 ml.

Nosnik: Otręby

Stosowanie:

- Przed użyciem należy obrócić butelkę i delikatnie nią wstrząsnąć.
- Nacisnąć środek nakrętki, aby otworzyć otwór dozujący.
- Rozprowadzić materiał na liściach lub przesypać do dozowników Dibox.
- Należy upewnić się, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
- Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Swirski-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 25 do 300 sztuk na m² na każde aplikację. Aplikację należy w razie potrzeby powtórzyć. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub

autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

	dawka	m ² z opakowania	odstęp (dni)	częstotliwość	uwagi
zapobiegawczo	25/m ²	2000	-	1x	wyłącznie w uprawach słodkiej papryki i oserżyny
małe nasilenie	50/m ²	1000			rozpocząć stosowanie, kiedy pojawią się wciornastki lub mączliki
duże nasilenie	100/m ²	500			wprowadzać wyłącznie w miejscach zaatakowanych, zwykle w połączeniu z innymi organizmami pożytecznymi

Warunki środowiskowe

Amblyseius swirskii działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 20 do 32°C (68-90°F). Skuteczność spada w temperaturach poniżej 18°C/64°F. Amblyseius swirskii jest ponadto wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Nie należy stosować łącznie z innymi drapieżnymi roztocznymi. Produkt może być łączony z roztocznymi Orius oraz parazytoidami mączlika.

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze: 1-2 dni.
Temperatura przechowywania: 12-14°C/54-57°F.
Warunki przechowywania: Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO₂.

Źródło opisu strona producenta

<https://www.koppert.pl/swirski-mite/>

Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.

Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i Floseva nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw**

produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)