Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep-ogrodnik.pl/swirski-mite-plus-100-saszetek-amblyseius-swirskii-drapiezny-roztocz-p-780.html



SWIRSKI-MITE PLUS 100 saszetek - Amblyseius swirskii - drapieżny roztocz.

Cena	**289,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**K-Swirski-Mite-Plus/100**
Producent	**KOPPERT**
UWAGA!	**Brak możliwości zwrotu żywy organizm**

Opis produktu

SWIRSKI - MITE PLUS 100 saszetek - Amblyseius swirskii

Amblyseius swirskii - drapieżny roztocz.

Zastosowanie:
Do zwalczania młodych larw różnych gatunków wciornastków oraz jaj i larw mączlików (Trialeurodes vaporariorum i Bemisia tabaci). Produkt SWIRSKI-MITE może być stosowany w różnych uprawach warzywniczych i ozdobnych, z wyjątkiem pomidorów.

Opakowanie:
papierowe saszetki z zawieszką 100 sztuk

Zawartość:
Saszetka papierowa z zawieszką zawiera 250 drapieżnych roztoczy oraz roztocza magazynowe zmieszane z otrębami.

Dodatkowe informacje o produkcie:
Dostępne w zakładce '' Więcej informacji " na karcie tego produktu

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !



Zasady zakupów i dostaw:
Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona roślin" kliknij tutaj

Towary z działu ''Biologiczna ochrona roślin'' wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi

produktami dostępnymi w sklepie. Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Więcej informacji

Swirski-Mite Plus - Amblyseius swirskii

Amblyseius swirskii
Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Zastosowanie:

Produkt Swirski-Mite zawierający drapieżny roztocz Amblyseius swirskii jest przeznaczony do zwalczania młodych larw różnych gatunków wciornastków oraz jaj i larwy mączlika (Bemisia tabaci i Trialeurodes vaporariorum)

Nazwa naukowa:

- Młode larwy różnych gatunków wciornastków, jaja i larwy mączlika.
- Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą
- Do stosowania w umiarkowanych warunków klimatycznych w uprawach pod osłonami
- Nie stosować na uprawach pomidorów.

Sposób działania

Drapieżne roztocza opuszczają saszetki i przechodzą na uprawy, gdzie przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Wygląd produktu: Saszetki w kartonowym opakowaniu.

Nośnik: Otręby

Opakowanie

Saszetka papierowa z zawieszką zawiera 250 drapieżnych roztoczy oraz roztocza magazynowe zmieszane z otrębami. W pudełku znajduje się 100

saszetek.

Stosowanie:

- Zawiesić saszetki w osłoniętych miejscach na roślinach z dala od bezpośredniego dostępu światła słonecznego.
- Saszetki mają już przygotowany otwór, przez który wydostają się roztocza.
- Trzymać saszetki za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Swirski-Mite Plus zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Stosować co najmniej 4000 saszetek na hektar i rozwieszać je w równych odstępach w uprawie. Powtórzyć po 4 tygodniach, jeśli pierwszy zabieg nie spowoduje zwalczenia szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Amblyseius swirskii działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 20 do 32°C (68-90°F). Preparat jest nieskuteczny w temperaturach poniżej 18°C (64°F). A. swirskii jest wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 60%.

Zastosowania z innymi produktami

Nie należy stosować łącznie z innymi drapieżnymi roztoczami. Produkt może być łączony z roztoczami Orius oraz parazytoidami mączlika.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Postępowanie z produktem

Czas przechowywania po odbiorze: 1–2 dni.

Temperatura przechowywania: 12-14°C/54-57°F.
Warunki przechowywania: Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO_2

	saszetek na 1m^2	odstęp (dni)	częstotliwość	uwagi
zapobiegawczo	1 na 2,5m	28-45	-	
małe nasilenie	1 na 2,5m	28	-	stosować gdy zauważymy mączliki lub wciornastki
duże nasilenie	1 na 1m	28	-	tylko zainfekowane obszary, zawsze w połączeniu z innymi dobroczynnym i roztoczami

Źródło opisu strona producenta
http://www.koppert.pl/

Ważne informacje:
Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i

pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.
Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i Floseva nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu ''Biologiczna ochrona" kliknij tutaj