

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/swirski-ulti-mite-20-saszetek-amblyseius-swirski-drapiezny-roztocz-p-3976.html>



## SWIRSKI ULTI-MITE 20 saszetek - Amblyseius swirski - drapieżny roztocz.

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Cena             | <b>125,00 zł</b>                            |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>                        |
| Numer katalogowy | <b>K-Swirski-Ulti-Mite/20sasz</b>           |
| Producent        | <b>KOPPERT</b>                              |
| UWAGA!           | <b>Brak możliwości zwrotu żywy organizm</b> |

### Opis produktu

#### SWIRSKI ULTI-MITE 20 saszetek - Amblyseius swirskii

##### Zastosowanie:

Saszetki z drapieżnym roztoczem Amblyseius swirskii przeznaczone do zwalczania młodych larwy różnych gatunków wciornastków oraz jaj i larw mączlika ( Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ). Nie stosować na uprawach pomidorów.

- Saszetki można stosować nie tylko w szklarni ale również w uprawach polowych.
- Populacja A. swirskii zaczyna się rozwijać, gdy temperatury w ciągu dnia regularnie przekraczają 20-22 ° C

##### Opakowanie:

20 saszetek

[Produkt dostępny też w większych opakowaniach KLIKNIJ TUTAJ.](#)

##### Zawartość:

W każdej saszetce znajduje się 250 szt drapieżnego roztocza Amblyseius swirskii + roztocza pokarmowe wymieszane z otrębami i zapakowane w pełni biodegradowalną foliową saszetkę z haczykiem

##### Przechowywanie:

Środki biologiczne nie nadają się do długotrwałego przechowywania należy je jak najszybciej wprowadzić do uprawy. (Środki biologiczne należy zamawiać na bieżące zastosowanie)

- Przechowywanie po otrzymaniu: 1-2 dni
- Temperatura przechowywania: 12-14°C, w ciemności
- Zapewnij wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się CO<sub>2</sub>

##### Dodatkowe informacje o produkcie:

Dostępne w zakładce " Więcej informacji " na karcie tego produktu

**UWAGA PRZECZYTAJ PRZED ZAKUPEM !**



✓ **Zasady zakupów i dostaw:**

[Przed dokonaniem zakupu uważnie przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw produktów z działu "Biologiczna ochrona roślin" kliknij tutaj](#)

✓ **Towary z działu "Biologiczna ochrona roślin" wysyłane są zawsze osobną paczką i nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami dostępnymi w sklepie.** Jeśli chcemy zakupić też inne produkty w sklepie należy zakończyć zamówienie i złożyć kolejne, które należy traktować jako odrębny zakup. W przypadku połączenia produktów z tego działu z innymi produktami ze sklepu celowa blokada uniemożliwi dokonanie zakupu.

Więcej informacji

## Swirski Ulti-Mlte 20 saszetek - Amblyseius swirskii

**Nazwa naukowa:** Amblyseius swirskii  
**Rodzaj organizmu:** Drapieżny roztocz

### Zastosowanie:

- Do zwalczania wciornastków i mączlików
- Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą
- Do stosowania w warunkach bardzo wysokiej lub bardzo niskiej wilgotności względnej
- Nie stosować na uprawach pomidorów.

**Młode larwy różnych gatunków wciornastków, jaja i larwy mączlika.**

### Sposób działania produktu:

Drapieżne roztocza opuszczają saszetki i przechodzą na uprawy, gdzie przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

**Wygląd produktu:** Saszetki w kartonowym opakowaniu. Każda saszetka zawiera 250 drapieżnych roztoczy oraz pokarm.

**Nośnik:** Otręby.

### Jak stosować ?

- Zawiesić saszetki w osłoniętych miejscach na roślinach z dala od

bezpośredniego dostępu światła słonecznego.

- Saszetki mają już przygotowany otwór, przez który wydostają się roztocza.
- Trzymać saszetki za kartonowy pasek u góry, aby nie uszkodzić drapieżnych roztoczy.

### Dawkowanie:

Dawkowanie preparatu Swirski Ulti-Mite zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz liczebności szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Rozprowadzać prewencyjnie lub z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Stosować co najmniej 4000 saszetek na hektar i rozwieszać je w równych odstępach w uprawie. Powtórzyć po 4 tygodniach, jeśli pierwszy zabieg nie spowoduje zwalczania szkodnika. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

|                       | <b>saszetek<br/>na m<sup>2</sup></b> | <b>odstęp<br/>(dni)</b> | <b>uwagi</b>                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapobiegawczo</b>  | 1                                    | 28-45                   |                                                                                   |
| <b>Małe nasilenie</b> | 2,5                                  | 28                      | stosować gdy zauważymy mączliki lub wciornastki                                   |
| <b>Duże nasilenie</b> | 2,5                                  | 28                      | tylko zainfekowane obszary, zawsze w połączeniu z innymi dobroczynnymi roztoczami |

### Warunki środowiskowe

Amblyseius swirskii działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 20 do 32°C. (68-90°F). Skuteczność spada w temperaturach poniżej 18°C/64°F. Amblyseius swirskii jest ponadto wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 60%.

### Zastosowania z innymi produktami

Nie należy stosować łącznie z innymi drapieżnymi roztoczami. Produkt może być łączony z roztoczami Orius oraz parazytoidami mączlika.

### Skutki uboczne

[Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu](#)

## Postępowanie z produktem

**Czas przechowywania po odbiorze:** 1-2 dni.  
**Temperatura przechowywania:** 10-15°C/50-59°F.  
**Warunki przechowywania:** Przechowywać w ciemnym miejscu.  
Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO<sub>2</sub>.

### Źródło opisu strona producenta

<http://www.koppert.pl/>

### Ważne informacje:

Przed zakupem Biologicznych środków ochrony roślin należy skonsultować się ze specjalistą z Koppert lub z nami przez formularz kontaktowy na stronie w celu zasadności wyboru środka i jego skuteczności w konkretnej uprawie.

Pisząc do nas należy szczegółowo opisać wszystkie informacje mogące mieć wpływ na skuteczność stosowania tych środków tj rodzaj uprawy (grunt czy szklarnia) termin stosowania, jakie pestycydy były wcześniej stosowane i kiedy, temperatura uprawy, rodzaj uprawy, monitoring nasilenia występowania szkodników. Na wszystkie wątpliwości odpowiada będą specjaliści z zakresu Biologicznej ochrony roślin, którzy udzielą Państwu szczegółowych informacji i pomogą w wyborze właściwego produktu.

Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.

Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i P.P.H.U. FLOS nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie.

zasady sprzedaży

**Uwaga !** Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)