

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/thripex-50-000-szt-dobroczynek-wielozerny-neoseiulus-cucumeris-p-990.html>



THRIPEX 50 000 szt - Dobroczynek wielożerny (Neoseiulus cucumeris)

Cena	210,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	K-Thripex
Producent	KOPPERT
Zasady zakupu / Terminy dostaw	Przed Zakupem przeczytaj
UWAGA!	Brak możliwości zwrotu żywy organizm

Opis produktu

ZASADY ZAKUPU I DOSTAW



Ten produkt należy do działu Biologiczna ochrona roślin i podlega specjalnym zasadom sprzedaży oraz wysyłki.

[Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z zasadami sprzedaży i dostawy w tym dziale, kliknij tutaj aby poznać szczegóły.](#)

- Produkty z działu Biologiczna ochrona roślin są wysyłane zawsze osobną przesyłką.
- Nie ma możliwości łączenia ich z innymi produktami z pozostałych działów sklepu.
- Jeśli chcesz kupić inne produkty, złóż osobne zamówienie, każde traktowane jest jako odrębna transakcja i dostawa.
- Brak możliwości zwrotu, produkt zawiera żywe organizmy

THRIPEX 50 000 szt - Dobroczynek wielożerny (Neoseiulus cucumeris)

Zastosowanie:

Do zwalczania różnych gatunków wciornastków. Dobroczynki żerują na jajach i pierwszym stadium larwalnym szkodników. Mogą żywić się także przędziorkami (np. roztoczem truskawkowcem i szklarniowcem), spadzią i pyłkiem. Nie stosować na uprawach pomidorów.

Opakowanie:

Butelka 1000 ml

Zawartość:

50 000 drapieżnych roztoczy (wszystkie stadia rozwojowe) + rozkruszki (wszystkie stadia rozwojowe) wymieszane z otrębami lub wermikulitem

Dodatkowe informacje o produkcie:

- Dostępne w zakładce "Szczegółowy opis" na karcie produktu
- Artykuł : [Wciornastki szkodliwość i zwalczanie metoda biologiczną czytaj](#)

Szczegółowy opis

Thripex

- Do zwalczania wciornastków
- Może odżywiać się pyłkiem lub inną ofiarą

Nazwa naukowa: Neoseiulus cucumeris

Rodzaj organizmu: Drapieżny roztocz

Kategoria produktu: Biologiczny wróg szkodników

Do czego użyć?

Szkodniki:

Młode larwy różnych gatunków wciornastków.

Rodzaje upraw:

Nie stosować na uprawach pomidorów.

Sposób działania

Drapieżne roztocza przebijają ofiary swoimi ssącymi aparatami gębowymi i wysysają ich wnętrzności.

Wielkość opakowania: 50 000, drapieżnych roztoczy.

Wygląd produktu: Butelka 1000 ml większe opakowania wiaderko

Nośnik: Otręby.

Instrukcja stosowania

Zastosowanie

- Przed użyciem należy delikatnie obrócić i wstrząsnąć butelkę lub wiaderko. Butelka: Wcisnąć środek nakrętki, aby otworzyć otwór dozujący.
- Wiaderko: Produkt Thripex należy rozkładać przy pomocy łyżki.
- Materiał należy rozprowadzić na liściach lub ułożyć małe pryzmy na matach z wełny mineralnej.
- Należy upewnić się, aby produkt pozostał na liściach co najmniej przez kilka godzin po zastosowaniu.
- Produkt należy rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni uprawy, co najmniej w 4000 miejsc na hektar.
- Produkt może być aplikowany przy pomocy urządzenia (Mini)-Air(o)bug.

Dawkowanie

Dawkowanie preparatu Thripex zależy od warunków klimatycznych, rodzaju upraw oraz ilości szkodników. Powinno być zawsze dostosowane do wymogów danej sytuacji. Aplikację należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych szkodników na uprawach. Prawidłowe dawkowanie wynosi od 50 do 100 sztuk na m² na każde aplikację. Aplikację należy w razie potrzeby powtórzyć. Aby uzyskać porady dotyczące najlepszej strategii zwalczania szkodników, należy skonsultować się z doradcą firmy Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów Koppert.

Warunki środowiskowe

Neoseiulus cucumeris działa najskuteczniej w temperaturach w przedziale od 15 do 25°C (59-77°F). Skuteczność spada w temperaturach powyżej 30°C/86°F. Neoseiulus cucumeris jest ponadto wrażliwy na wilgotność względną powietrza poniżej 70%.

Zastosowania z innymi produktami

Preparat może być łączony z roztoczami Orius. Nie należy mieszać preparatu z innymi drapieżnymi roztoczami (Amblyseius swirskii, Amblydromalus limonicus, Transeius montdorensis, Amblyseius andersoni).

Ostrzeżenia

Zastosowanie tego produktu może wywołać uczulenie lub reakcje alergiczne. W związku z tym zalecamy zachowanie niezbędnych środków ostrożności.

Skutki uboczne

Pestycydy mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na roztwory biologiczne. Dowiedz się, które pestycydy wywołują skutki uboczne istotne dla tego produktu

Postępowanie z produktem

- Czas przechowywania po odbiorze: 1-2 dni.
- Temperatura przechowywania: 10-15°C/50-59°F.
- Warunki przechowywania: Przechowywać w ciemnym miejscu. Zapewnić wentylację, aby uniknąć nagromadzenia CO².

Uwaga!

- Częstotliwość wprowadzania produktu powinna być dostosowana do sposobu działania produktu i efektów spodziewanych w danej uprawie. Prosimy o kontakt z lokalnym konsultantem Koppert lub autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy, który udzieli Państwu dalszych informacji.
- Stosuj wyłącznie produkty dopuszczone do obrotu w Twoim kraju i odpowiednie dla Twoich upraw.
- Sprawdź lokalne wymogi rejestracji. Koppert Biological Systems i FLOSEVA nie jest odpowiedzialny za nieprawne użycie.

zasady sprzedaży

Uwaga ! Przed dokonaniem zakupu uważnie **przeczytaj zasady sprzedaży i dostaw** produktów z działu "Biologiczna ochrona" [kliknij tutaj](#)