

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/vitrol-gb-butelka-1kg-preparat-na-slimaki-bros-p-4594.html>



## VITROL GB butelka 1kg preparat na ślimaki - BROS

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Cena      | <b>47,99 zł</b> |
| Producent | <b>BROS</b>     |

### Opis produktu

#### VITROL GB 1kg Butelka - BROS

- ✓ Vitrol przeznaczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym
- ✓ Vitrol może być stosowany w obecności zwierząt domowych, jeży i ptaków
- ✓ Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Vitrol GB to moluskocyd w formie granulatu - przynęty gotowej do użycia (RB) przeznaczony jest do zwalczania ślimaków nągich i oskorupionych w uprawie roślin w ogrodach przydomowych i działkowych.

Odpowiednio dobrana przynęta skutecznie wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadana. Mechanizm działania substancji czynnej zawartej w produkcie Vitrol (pirofosforanu żelaza) polega na redukcji wydzielania śluzu przez ślimaki. Środek powoduje natychmiastowe zahamowanie żerowania ślimaków w uprawie. Szkodniki tracą apetyt i zaprzestają uszkodzania roślin.

Środek Vitrol zawiera substancję czynną ulegającą rozkładowi na jony fosforanowe i jony żelaza, które naturalnie występują w glebie.

#### Zawartość substancji czynnej:

Pirofosforan żelaza - 24g/kg (2,4%)

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

#### Etykieta produktu

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

**Opakowanie:** Butelka 1kg

### Stosowanie środka Vitrol

**Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.**

### Truskawka i inne rośliny sadownicze (w uprawie polowej, szklarniowej)

**i pod osłonami) ślimaki nagie, oskorupione**

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10m<sup>2</sup>

Termin stosowania: Środek stosować po rozpoczęciu wegetacji lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy) 6, odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

**Aksamitka, funkia i inne rośliny ozdobne ( w uprawie polowej, szklarniowej i pod osłonami) ślimaki nagie.**

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25g/10m<sup>2</sup>.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-25g/10m<sup>2</sup>. Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy) 6, odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni