

Link do produktu: <https://sklep-ogrodnik.pl/vitrol-gb-butelka-200g-50g-preparat-na-slimaki-bros-p-4674.html>



VITROL GB butelka 200g + 50g preparat na ślimaki - BROS

Cena	18,99 zł
Producent	BROS

Opis produktu

VITROL GB 200g + 50g Butelka - BROS

- ✓ Vitrol przeznaczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym
- ✓ Vitrol może być stosowany w obecności zwierząt domowych, jeży i ptaków
- ✓ Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Vitrol GB to moluskocyd w formie granulatu - przynęty gotowej do użycia (RB) przeznaczony jest do zwalczania ślimaków nągich i oskorupionych w uprawie roślin w ogrodach przydomowych i działkowych.

Odpowiednio dobrana przynęta skutecznie wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadana. Mechanizm działania substancji czynnej zawartej w produkcie Vitrol (pirofosforanu żelaza) polega na redukcji wydzielania śluzu przez ślimaki. Środek powoduje natychmiastowe zahamowanie żerowania ślimaków w uprawie. Szkodniki tracą apetyt i zaprzestają uszkodzania roślin.

Środek Vitrol zawiera substancję czynną ulegającą rozkładowi na jony fosforanowe i jony żelaza, które naturalnie występują w glebie.

Zawartość substancji czynnej:

Pirofosforan żelaza - 24g/kg (2,4%)

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Etykieta produktu

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

Opakowanie: 250g

Stosowanie środka Vitrol

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Truskawka i inne rośliny sadownicze (w uprawie polowej, szklarniowej)

i pod osłonami) ślimaki nagie, oskorupione

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7g/10m²

Termin stosowania: Środek stosować po rozpoczęciu wegetacji lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy) 6, odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Aksamitka, funkia i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej, szklarniowej i pod osłonami) ślimaki nagie.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25g/10m².

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12-25g/10m². Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami (BBCH 00) lub po wschodach lub po posadzeniu roślin i w późniejszym okresie wegetacji, natychmiast po pojawieniu się szkodników lub po zaobserwowaniu pierwszych szkód.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (cykl uprawy) 6, odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni